



POOPERAČNÍ PÉČE: **Náhrada předního zkříženého vazů** **& Řešení mediální luxace pately**

1. Váš pes musí být držen v omezeném prostoru jako např. kotec, garáž nebo malý pokoj ve Vašem bytě během prvních 3-4 týdnů po chirurgickém zákroku na koleni. Důvodem takového omezení je snaha zabránit Vašemu psovi v poškození náhrady vazů, rekonstrukce pouzdra či implantátů, při běhání a skákání. Pozor zejména na pohyb na linoleu nebo dlaždicích např. po zazvonění domovního zvonku. Po uplynutí doby 3-4 týdnů bude potřeba omezit Vašeho miláčka na krátké procházky na vodítku (do 500 m) nebo plavání po dobu dalších 2 měsíců. Tato doba umožní dostatečné zhojení chirurgické rány a udržení pevnosti nově vytvořených vazů. **Pohyb bez vodítka nesmí být psovi umožněn během prvních 10-12 týdnů po operaci.**
2. Bandáž na končetině Vašeho psa musí být udržována v čistotě a suchu. Jestliže hrozí riziko namočení nebo zvlhnutí bandáže, překryjte prosím preventivně bandáž plastovým obalem (sáček z pevného igelitu, rukavice na mytí nádobí apod.), který můžete bránit před prodřením například starou ponožkou. **Neponechávejte plastový obal na bandáži příliš dlouho, protože hrozí akumulace vlhkosti pod plastem a infekce kůže pod bandáží!** Jestliže Vašemu psovi vyčnívají prsty ze spodní části bandáže, kontrolujte je prosím denně a zaznamenejte případný otok. Jestliže jsou studené nebo oteklé, bandáž může bránit dostatečné cirkulaci krve a **musí být neprodleně vyměněna**. Jestliže podobné příznaky zaznamenáte, ihned nás kontaktujte. Jestliže prsty pod bandáží nevyčnívají, štípněte do nich přes bandáž, až Váš miláček zareaguje. Bandáž se přikládá pouze v některých případech a to většinou na dobu maximálně 2 týdnů. Vlivem normální aktivity psa se horní část trochu uvolní a místo chirurgického řezu může částečně vyčnívat. To nebývá většinou problém, pokud si Váš pes nezačne ránu olizovat nebo kousat. Je třeba mu v tom každopádně zabránit. Jestliže rána vypadá nečistě, je možno ji jemně ošetřit teplou vodou a desinfekčním roztokem. Ve většině případů to nebývá nutné, pokud má pes bandáž. **V případě hojení bez bandáže** se rána potírá 2x denně desinfekčním roztokem, (po něm lze aplikovat i odvar z byliny řepíku lékařského, vždy po instrukci veterináře).
3. Jestliže zjistíte, že Váš pes má obtíže se vstáváním nebo chůzí s bandáží, můžete použít ručník nebo deku pod břicho jako závěs pro podporu pohybu zadní části těla. Lehce Vašeho psa zdvihněte a podporujte pánevní končetiny při chůzi. Tuto pomůcku Vám velmi rádi předvedeme při kontrole. V těchto případech je někdy vhodné do ručníku vystříhnout 2 otvory pro prostrčení pánevních končetin a zhotovit takto jakési kalhotky.
4. Váš miláček může vyžadovat mnoho pozornosti a trpělivosti během této rekonvalescenční doby. Vaší největší snahou bude omezit pohyb a aktivitu Vašeho psa během 3-měsíční pooperační periody. Jestliže máte jakékoliv dotazy, potřebujete pomoc nebo radu, neostýchejte se a kontaktujte nás. Během ordinálních hodin jsme většinou dostupní na pevné lince nebo mobilním telefonem, mimo ordinální hodiny a o víkendech na mobilním telefonem. Děkujeme Vám, že nám umožňujete poskytnout Vašemu psovi péči, kterou si zaslouží.
Kolektiv Kliniky ARVET