



POOPERAČNÍ PÉČE: **Trojité osteotomie pánve (TPO)**

Váš pes podstoupil osteotomii pánve pro korekci chybně vyvinutého kyčelního kloubu. Kyčelní kloub funguje na principu kuličky a jamky. Rozdělení pánevní kosti na 3 díly umožní rotaci jamky do pozice, která umožní lepší překrytí hlavice a větší stabilitu kyčelního kloubu. Jamka je držena v nové pozici pomocí ocelové ploténky a šroubů. Protože kost byla rozdělena pilou, bude trvat nejméně 4-8 týdnů než se dostatečně zhojí a snese normální zátěž! Do té doby je veškerá zátěž při chůzi přenášena na malou ploténku a šrouby!

Protože pes nemůže chodit o berlič a protože má poněkud vyšší práh bolesti, bude mít tendenci zatěžovat končetinu příliš brzy a přetěžovat tak implantáty. Mladí psi jsou zvláště problematictí, protože jejich kosti jsou měkké a šrouby v nich hůře drží. Také se obtížněji omezuje jejich aktivita! **Je proto velmi důležité omezit aktivitu Vašeho miláčka alespoň 4 týdny po operaci! Musí být držen v malé místnosti a chodit pouze na vyvenčení na vodítku.** Jestliže je na hladké podlaze nebo musí překonávat schody, je vhodné pod břichem provléknout ručník nebo hadr a podpořit jeho stabilitu. Je možné vystříhnout do ručníku 2 otvory, provléknout jimi pánevní končetiny a použít ručník jako kalhoty.

Klíčem k úspěchu je striktní omezení aktivity po dobu alespoň 4 týdnů! Do té doby se u většiny psů rozříznutá pánevní kost zhojí a nemusíme se dále spoléhat na kovovou ploténku a šrouby. Do 8 týdnů po zákroku jsou kosti většinou pevně srostlé a Váš pes se může vrátit k normální aktivitě. V této době již kovová ploténka a šrouby nejsou nezbytně potřebné, ale protože by pro jejich odstranění musel pacient podstoupit další zákrok, u většiny pacientů se ponechávají. První 4 týdny po operaci jsou pro všechny obtížné, ale jestliže vedou ke štěstí, zdraví a funkčnímu kyčelnímu kloubu, stojí vynaložené úsilí zato!

Někteří psi mají po zákroku potíže s močením a kálením. Tyto problémy jsou většinou krátkodobé, jestliže se včas podchytí a řeší. Laktulóza změkčí stolicí a usnadní kálení po zákroku (dávkování Vám rozvrhne veterinární lékař). **Jestliže má Váš pes problémy s močením, močí mnohokrát v menších kvantech, bezprostředně nás informujte!** Existují léky (tablety), které mohou tento problém vyřešit. Možná bude potřeba vyprazdňovat pacientovi pravidelně 3-4x denně močový měchýř. Stojícímu psu jemně zatlačte z boku dlaněmi na břicho (v místě, kde přechází pod pánevní končetiny) v době kdy močí. Jestliže však Váš miláček močí normálně, není to zapotřebí.

Každý pes a každý případ je něčím zvláštní. Jestliže máte další otázky, neostýchejte se a ptejte se! Během ordinačních hodin jsme vždy připraveni Vaše dotazy zodpovědět. Mimo ordinační hodiny a o víkendech jsme dostupní na mobilním telefonu. Děkujeme za Vaši důvěru při péči o Vašeho miláčka.

Kolektiv Kliniky ARVET

Tel: 382 215 038, 603 496 589